

ACTYL POUR-ON

Ectoparasitocida e insectocida pour-on de amplio espectro

Composición:

Fipronil	1 gr
Excipientes c.s.p.	100 ml

Indicaciones:

ACTYL Pour-on (Garrapaticida e Insectocida para bovinos) está indicado para el tratamiento y control de Garrapata (*Boophilus microplus*); Mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*); Miasis o Bichera (*Cochlyomyia homminivorax*); Ura o Berne (*Dermatobia hominis*).
Auxiliar en el control de Piojos masticadores y Piojos chupadores (*Damalinia bovis* y *Solenopotes capillatus*).

Especies:

Bovinos, ovinos, cuyes y conejos

Dosis:

ACTYL POUR-ON es una solución de uso tópico para aplicación pour-on.

Aplicar 1 mL de ACTYL POUR-ON cada 10 Kg de peso vivo (equivalente a 1 mg de Fipronil/Kg de peso vivo).

Dosis mínima por animal: 10 mL.

Para erradicación de la garrapata, debe repetirse el tratamiento cada 35 días.
Aplicar en el dorso del animal, en una franja desde la cruz hasta la base de la cola.

Tabla de Dosificación	
Kg p.v.	mL
50 - 200	20
200 - 300	30
300 - 400	40
400 - 500	50

Limitaciones de Uso:

No utilizar en animales menores a 10 semanas de vida.

No aplicar en animales mojados. Las precipitaciones que se producen en forma inmediata a su aplicación, pueden disminuir la eficacia del producto. Evitar la sobredosificación, especialmente en animales debilitados, preñados o estresados.

No aplicar en ganado lechero, cuya leche sea destinada al consumo humano.

No utilizar en ganado lechero durante los últimos tres meses previos al parto.

No presenta contraindicaciones en vacas preñadas.

Precauciones:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Se recomienda el uso de guantes durante su aplicación.

Conservar el producto en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz solar directa, a temperaturas entre 5°C y 30°C

No fumar ni comer mientras se manipula el producto.

Evitar todo contacto con la piel, ojos o vestimenta.

En caso de contacto accidental con el producto, lavar las partes expuestas con abundante agua y jabón.

No volver a utilizar los envases vacíos.

Eliminar los envases ya utilizados según la legislación del país.

Advertencia: producto tóxico: Categoría Toxicológica según OMS: II Moderadamente peligroso.

Tiempo de Espera:

Carne: 50 días.

Leche: El producto no debe ser utilizado en vacunos cuya leche sea destinada al consumo humano. No utilizar en vacas lecheras durante los últimos 3 meses previos al parto.

Presentación:

Frascos de 30 ml, 100 ml, 250 ml y 1 litro.

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria.



Laboratorios Calier
Uruguay
www.calier.com/uruguay

DISTRIBUIDO POR:



Servicios Integrados de
Producción Animal S.A.
☎ +51 981 360 341
www.servipran.com