



actyl

POUR-ON


FIPRONIL 1%



**GARRAPATICIDA
E INSECTICIDA DE
AMPLIO ESPECTRO
PARA BOVINOS**



Efecto Reservorio a Nivel de Glándula Sebácea



GARRAPATICIDA



MOSQUICIDA
MOSCA DE LOS CUERNOS



TRATAMIENTO
CONTRA MIASIS



TRATAMIENTO
CONTRA TUPE

98.7%
DE CONTROL
SOBRE EL CICLO
PARASITARIO

PODER RESIDUAL
de 46 días
Frente a las
reinfestaciones
por larvas
de garrapatas
(B. Microplus)

**PORCENTAJE
DE ECLOSIÓN
AL DÍA 67
POST TRATAMIENTO=0**
Se prolonga
el efecto
de limpieza
sobre la postura

Esquema de Dosificación	
Peso vivo (Kg)	Dosis(ml)
50 kg	5.00 ml
100 kg	10.00 ml
200 kg	20.00 ml
300 kg	30.00 ml
400 kg	40.00 ml

ACTYL POUR-ON Solución de aplicación externa – Pour-on

Composición: Fipronil 1 gr, Excipientes c.s.p. 100 ml, **Indicaciones:** Garrapaticida e Insecticida para bovinos. Indicado para el tratamiento y control de la Garrapata (*Boophilus microplus*); Mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*) Miasis o Bichera (*Cochlyomyia homminivorax*) Tupe o Berne (*Dermatobia hominis*). Piojos masticadores (*Damalinea bovis* y *Solenopotes capillatus*). **Dosificación:** Dosis: Aplicar 10 ml de ACTYL Pour-on cada 100 kg de peso vivo (equivalente a 1 mg de Fipronil / kg de peso vivo). No repetir el tratamiento hasta los 60 días. **Modo de aplicación:** Actyl Pour-on es una solución de uso tópico para aplicación pour-on. Aplicar en el dorso del animal, en una franja desde la cruz hasta la base de la cola. Es aconseja no aplicar en animales mojados; las precipitaciones que se producen en forma inmediata a su aplicación, pueden disminuir la eficacia del producto. **Limitaciones de Uso:** No utilizar en animales menores de 10 semanas. Evitar la sobre dosificación, especialmente en animales debilitados, estresados. No aplicar en ganado lechero, cuya leche sea destinada al consumo humano. No utilizar en ganado lechero durante los últimos tres meses previos al parto. No presenta contraindicaciones en vacas preñadas. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No volver a utilizar los envases vacíos. Enterrar o incinerar los envases ya utilizados. Para uso externo únicamente. **Tiempo de Espera:** Carne: 50 días. Leche: El producto no debe ser utilizado en vacunos cuya leche sea destinada al consumo humano. Presentación: Frascos de 30, 100 y 250 ml y de doble boca con dosificador 1 litro.