

## CALIMIX

Antiparasitario externo - garrapaticida e insecticida de amplio espectro

### Composición:

Cipermetrina	10 g
Ethion	40 g
Excipientes y agentes emulsionantes c.s.p.	100 g

### Indicaciones:

CALIMIX concentrado emulsionable, se utiliza en baños de inmersión y aspersion para el control de moscas, garrapatas, piojos y ácaros de la sarna en bovinos.

Ectoparasiticida. Garrapaticida con prolongado poder residual (8 a 14 días), piojicida, sarnífugo y mosquicida. Insecticida con acción repelente por un período de 3 a 4 semanas.

Tratamiento y prevención de ectoparásitos garrapatas, piojos chupadores y masticadores, sarna y Mosca de los Cuernos (*Haematobia irritans*).

El espectro de acción incluye:

Acaros y Garrapatas: *Boophilus microplus* (Garrapata común del bovino), *Psoroptes spp.*, *Sarcoptes scabiei*, *Notoedres cati*.

Moscas y tábanos: *Musca spp.*, *Haematobia irritans* (mosca de los cuernos), *Callitroga hominivorax*, *Sarcophaga carnaria*, *Lucillia sericata*, *Tabanus spp.*, *Dermatobia hominis*.

Piojos: *Damalinia Boris*, *Damalinia ovis*, *Bovicola subrostratus*, *Haematophinus eurysternus*, *Haematophinus asini*.

### Especies:

Bovinos, equinos y porcinos.

### Dosificación:

Se utiliza como baño de inmersión o aspersion.

Realizar lentamente una premezcla agregando un volumen de producto en dos volúmenes de agua agitando para homogeneizar correctamente.

En el caso de baños de inmersión:

- Pie de baño: 1 litro de CALIMIX cada 1000 litros de agua.
- Reposición: 1,5 litros de CALIMIX cada 1000 litros de agua a reponer.
- Refuerzo en seco: 0,5 litros de CALIMIX cada vez que el baño disminuya 1000 litros.

En caso de baños por aspersion:

- 1 litro de CALIMIX cada 1000 litros de agua.

\* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.

Tabla de Dosificación	
Calimix (ml)	Agua ( L)
1	1
20	20
1,000	1,000

### Intervalo entre dosis:

Para el caso de limpieza de la manada: Aplicaciones con 6, 8 ó 10 días de intervalo.

Para erradicación de garrapatas: Bañar cada 21 días hasta la eliminación del parásito (aproximadamente 10 baños durante la temporada de garrapata de agosto a mayo).

Para realizar un control eficiente de garrapatas: Bañar cada 28 días.

Para tratamiento de sarna: Realizar 2 aplicaciones con 10 días de intervalo.

**Precauciones:**

CALIMIX es un producto tóxico, clasificado dentro de la categoría III: Moderadamente Tóxico. Puede ser fatal en caso de ser ingerido. En caso de ingestión accidental, acudir al médico con el envase.

El antídoto del Ethion es el Sulfato de Atropina.

Realizar tratamiento sintomático. No suministrar leche ni sustancias que contengan grasas pues puede favorecer la absorción. En caso de ingestión accidental del producto, realizar lavado gástrico y tratamiento sintomático.

En caso de contacto accidental con el producto, lavar las partes expuestas con abundante agua y jabón

Se recomienda el uso de guantes durante su aplicación.

No fumar ni comer mientras se manipula el producto.

Evitar todo contacto con la piel, ojos o vestimenta.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Conservar el producto en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz solar directa, a temperaturas entre 15°C y 30°C

Eliminar los envases ya utilizados según la legislación del país.

**Tiempo de Espera:**

Carne: 15 días

Leche: 2 días

**Presentación:**

Fascos de 20 ml, 100 ml, 250 ml y 1 litro.

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria.



Laboratorios Calier  
Uruguay  
[www.calier.com/uruguay](http://www.calier.com/uruguay)

DISTRIBUIDO POR:



Servicios Integrados de  
Producción Animal S.A.  
☎ +51 981 360 341  
[www.servipran.com](http://www.servipran.com)