

Composición:

Menbutona	100 mg
Excipientes c.s.p.	1ml

Descripción:

La Menbutona actúa como colerético-colagogo y estimulante específico de la digestión sobre las glándulas del tracto digestivo, aumentando la secreción biliar, pancreática y también la secreción de pepsina.

Especies: Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos y perros.

Indicaciones:

- Bovinos: Timpanismo, indigestiones, toxemias, cetosis, anorexia, insuficiencias hepática y pancreática.
- Ovinos y caprinos: indigestiones, toxemias (incluida la de la gestación), intoxicaciones, insuficiencias hepática y pancreática.
- Porcinos: indigestiones, anorexia, intoxicaciones, insuficiencias hepática y pancreática.
- Equinos: Toxemias, anorexia, cólicos, insuficiencias hepática y pancreática.
- Perros: Indigestiones, toxemias, anorexia, estreñimiento, insuficiencias hepática y pancreática.

Dosificación:

Vía endovenosa lenta o intramuscular, durante 2 a 3 días consecutivos

Bovinos adultos: 20-40 ml/animal/día, Terneros: 5-15 ml/animal/día.

Equinos: 20-30 ml/animal/día, solo vía endovenosa lenta.

Ovinos y Caprinos: 5-10 ml/animal/día.

Porcino: 1 ml/10 kg de peso vivo/día.

Perros: 0,1 ml/kg de peso vivo/día.

La administración endovenosa debe hacerse lentamente (en tiempo no inferior a 1 minuto) para evitar la aparición temblores, respiración acelerada, defecación espontánea, tos, lagrimeo, estornudos y caída de animal.

Se recomienda no inyectar por vía intramuscular más de 20 ml en un solo punto de aplicación.

Contraindicaciones:

No administrar a animales con alteraciones cardíacas, hipertermia u obstrucción en las vías biliares. No administrar a gatos en ningún caso.

No administrar a hembras en el último tercio de gestación

Precauciones:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Conservar el producto en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz solar directa, a temperaturas entre 15°C y 30°C.

Tiempo de Espera: No precisa.

Presentación: Frascos de 100 ml.

Uso veterinario