

RETARDOESTEROIDE

Glucocorticoide esteroide en suspensión inyectable en solución inyectable

Composición:

Triamcinolona	2 mg
Excipiente c.s.p.	1ml

Descripción:

La triamcinolona es un glucocorticoide sintético derivado del cortisol con una actividad antiinflamatoria 5 veces mayor que éste, y sin apenas actividad mineralocorticoide. Al igual que los demás glucocorticoides tiene multitud de efectos en el organismo.

Especies: Bovinos, equinos y perros.

Indicaciones:

Tratamiento de procesos inflamatorios o alérgicos
Cetosis en bovinos.

Dosificación:

Administración por vía intramuscular o subcutánea:

- Caballos: 0,02 - 0,04 mg de acetónido de triamcinolona/kg p.v., en dosis única (equivalente a 0,01 - 0,02 ml de medicamento / kg p.v.). No exceder en lo posible 12 - 20 mg triamcinolona / animal, equivalente a 6 - 10 ml/animal.
- Perros y gatos: 0,1 - 0,2 mg de acetónido de triamcinolona / kg p.v., en dosis única (equivalente a 0,05 - 0,1 ml de medicamento / kg p.v.). La remisión suele ser al cabo de 7 - 15 días. Si recurren los síntomas, puede repetirse la dosis.
- Bovinos: 0,01 -0,02 ml/kg de peso vivo (6 - 10 ml/animal), en dosis única.

Administración por vía intraarticular o intrasinovial

- Caballos: 6 - 18 mg de acetónido de triamcinolona / animal, en dosis única (equivalente a 3 - 9 ml de medicamento / animal). Repetir la misma dosis a los 3 - 4 días, en caso necesario.
- Perros y gatos: 1 - 3 mg de acetónido de triamcinolona / animal, en dosis única (equivalente a 0,5 - 1,5 ml de medicamento / animal). Repetir la misma dosis a los 3 - 4 días, en caso necesario

Contraindicaciones:

Salvo en situaciones de emergencia, no usar en animales que padezcan diabetes mellitus, nefritis crónica, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca u osteoporosis.

No usar en caso de infecciones víricas durante la fase virémica o en casos de infecciones micóticas sistémicas.

No usar en animales con enfermedades bacterianas sin establecer el tratamiento antibiótico adecuado.

No usar en animales con úlceras gastrointestinales o corneales.

No usar en animales con demodicosis.

No administrar por vía intraarticular si existen fracturas, infecciones bacterianas en las articulaciones o necrosis ósea.

No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa, a los corticoesteroides o a cualquiera de los excipientes.

No usar en la gestación

Precauciones:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Conservar el producto en lugar fresco y seco, al abrigo de la luz solar directa, a temperaturas entre 15°C y 30°C.

Tiempo de Espera:

No precisa.

Presentación:

Frascos de 50 ml.

Uso veterinario - medicamento sujeto a prescripción veterinaria.



Laboratorios Calier
Barcelona, España
www.calier.com/espana

DISTRIBUIDO POR:



Servicios Integrados de
Producción Animal S.A.
☎ +51 981 360 341
www.servipran.com