



SUPERVIT AD₃E

Vitaminas A, D₃ y E en solución inyectable

Composición por ml:

Vitamina A:	500.000 U.I.
Vitamina D ₃ :	75.000 U.I.
Vitamina E:	50 U.I.



Descripción:

Vitamina A (palmitato de retinol): Es una vitamina esencial para el crecimiento, la reproducción y el funcionamiento de la mayoría de los órganos; ayuda a mantener la integridad de los tejidos epiteliales. Vitamina D₃ (colecalfiferol): Interviene en la regulación del metabolismo del calcio y del fósforo, incrementando la absorción intestinal y tubular del calcio, siendo además necesaria para la mineralización apropiada de la matriz cartilaginosa que se desarrolla en las epífisis óseas.

Vitamina E (acetato de todo-rac- α tocoferilo): Evita la oxidación de los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas, impidiendo la formación de radicales libres y de peróxidos que son causa de degeneración y destrucción celular.

Especies de Destino:

Bovino, porcino, ovino y equino.

Indicaciones:

En todas las especies, tratamiento y prevención de deficiencia de vitaminas A, D₃ y E. Trastornos de reproducción e hipofunción ovárica. Durante la preñez. Raquitismo. Osteomalacia. Degeneración ósea. Alteraciones del metabolismo. Anorexia. Fiebre vitularia. Estimulante del crecimiento y del apetito. En los cambios de alojamientos y transporte. En las vacunaciones y tratamientos para combatir enfermedades infecciosas o parasitarias.

Dosificación:

Vía intramuscular, en dosis única.
Bovinos adultos: 5 ml /animal
Terberos: 3-4 ml /animal
Porcinos adultos: 2 ml /animal
Lechones: 1 ml /animal
Caballos: 5 ml /animal
Ovinos adultos: 2 ml /animal
Corderos: 1 ml /animal

Contraindicaciones y advertencias

En muy raras ocasiones puede aparecer una pequeña reacción local en el punto de inoculación, que desaparece en poco tiempo.

No se deben administrar dosis superiores a las recomendadas. Si las vitaminas liposolubles se administran en exceso pueden aparecer efectos secundarios asociados a una hipervitaminosis.

Precauciones

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en lugares ventilados y frescos a temperatura de 15 y 30°C, protegida de la luz solar directa.

Tiempo de retiro:

Carne: 28 días. Leche: Cero días.

Presentación:

Frasco de 100 y 250 ml

Uso veterinario.