



FLUBENZIM FORTE

Antiparasitario Oral

Forma farmacéutica

Suspensión Oral

Composición

Flubendazol 10 g
Triclabendazol 10 g



La acción antihelmíntica de los bencimidazoles viene dada por una acción antimitótica sobre el parásito, la cual se produce por una rotura en la formación del eje mitótico (Seiler, 1975).

El proceso por el que actúa sobre la capacidad mitótica del parásito consiste en la unión de los bencimidazoles a las moléculas de tubulina, causando una inhibición de la formación de los microtúbulos con una ruptura de la organización microtubular y consecuentemente una interrupción de la división celular (Davidse & Flach, 1978).

Los bencimidazoles actúan ligándose a la tubulina dimérica del nemátodo de forma específica, la cual, al girar, impide la polimerización de tubulina durante el ensamblaje del microtúbulo.

Indicaciones*

Indicado en el tratamiento de: Nemátodos pulmonares, gastrointestinales, Anoplocephalideos (*Taenias*), Fasciola hepática, gusano de la cabeza (*Oestrus ovis*), de los ovinos y caprinos.

El espectro de acción comprende:

Nemátodos gastrointestinales (formas adultas y larvaria en el cuarto estado): *Haemonchus contortus*, *Oesophagostomum spp*, *Bunostomum spp*, *Ostertagia ostertagi*; *Ostertagia lyrata*; *Trichostrongylus spp*; *Cooperia oncophora*; *Cooperia punctata*; *Cooperia pectinata*, *Strongyloides papillosus*; *Nematodirus helevetianus*; *Nematodirus spathiger*; *Nematodirus filicollis*.

Nemátodos pulmonares: *Dictiocaulus viviparus*; *Dictiocaulus filaria*. *Anoplocephalideos (Taenias)*, gusano de la cabeza (*Oestrus ovis*).

Trematodes: *Fasciola hepática madura e inmadura (hasta 2 días de edad)*.

* Indicaciones, posología y tiempo de espera pueden variar de acuerdo al registro de cada país.

Posología*

1 ml de Flubenzim Forte cada 10 kg de peso vivo (equivalente a 10 mg/Kg p.v. de flubendazol y 10 mg/kg p.v. de triclabendazol).

Contraindicaciones

Mantener el producto en su envase cerrado, en un lugar seco y fresco,

protegido de la luz y el calor del sol, y fuera del alcance de los niños.

Límites de temperatura de conservación sugeridos: 4 a 30° C.

Destruir los envases vacíos de acuerdo a la legislación existente en el País, o enviarlo al centro de acopio más cercano.

Tiempo de espera*

Carne: 28 días.

Leche: No administrar a hembras en lactación cuyo destino sea el consumo humano, hasta 30 días después de haber sido dosificadas.

Producto de origen

Uruguay

Presentación

1 y 3L