

# Fosfomicin-Pro

Solución Oral

## COMPOSICIÓN:

<b>Fosfomicina sódica</b>	<b>10.0 g</b>
<b>Trimetoprim</b>	<b>2.5 g</b>
<b>Excipientes c.s.p.</b>	<b>100.0 g</b>

## DESCRIPCIÓN:

FOSFOMICIN-PRO es un antibiótico de amplio espectro. Actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular.

### Agentes susceptibles:

**Gram negativos:** *E. coli*, *Klebsiella sp.*, *Pseudomona aeruginosa*, *Salmonella sp.*, *Pasteurella sp.*, *Haemophilus sp.* y actividad moderada contra *Vibrio spp*, *Avibacterium paragallinarum*.

**Gram positivas:** *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus sp.* y actividad moderada contra *Clostridium spp*.

## INDICACIONES:

FOSFOMICIN-PRO está indicado para el tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles:

**Aves:** Colibacilosis aviar, coriza infecciosa, cólera aviar, estafilococosis, tifosis aviar, enteritis ulcerativa, onfalitis aviar y bacterias asociadas a la enfermedad respiratoria crónica (CRD).

## ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

### Aves:

10 mg de fosfomicina/ Kg peso vivo, equivalente a 1 ml de FOSFOMICIN-PRO/ L de agua de bebida durante 3 - 5 días.

La dosificación puede ser ajustada según el criterio del Médico Veterinario tratante.

## CONTRAINDICACIONES:

No administrar en animales con historial de hipersensibilidad a la sustancia activa.

## PERIODO DE RETIRO:

Aves: Carne: 5 días; Huevos: 1 día.

## ALMACENAMIENTO:

Almacenar en lugar fresco entre 15°C y 30°C.

Proteger de la humedad y la luz.

El producto no debe ser utilizado después de la fecha de vencimiento.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

## PRESENTACIONES:

Frascos de 1 L.

