# REVIVE

Rehidratante y energizante oral

**Composición:** Cada sobre de 50.00 g contiene:

| | |
|---|---|
| Bicarbonato de sodio | 10. 50 g |
| Cloruro de sodio | 2.50 g |
| Cloruro de potasio | 2.20 g |
| Sulfato de magnesio | 0.80 g |
| Dextrosa anhidra | 34.00 g |

**Indicaciones:**

Tratamiento y prevención de cuadros de deshidratación, desequilibrio electrolítico y carencia energética causados por diarreas de cualquier origen, nutricionales, bacterianas o virales.

**Especies de destino:** Terneros, lechones, corderos

**Dosificación:**

Disolver un sobre de 50 g en 2 dos litros de agua potable tibia (39° C) en recipientes limpios (baldes, bebederos) y suministrar al animal sin dejar enfriar.
Terneros: de 2 a 4 litros / día, durante 4 a 5 días consecutivos.
Lechones y corderos: 0.5 litros / día, durante 4 a 5 días consecutivos.

**Precauciones**

Utilizar bebederos, baldes y utensilios bien limpios para preparar y suministrar la solución de rehidratación oral.

A los primeros síntomas de diarrea deberá suspenderse en forma total o parcial la leche o sustituto lácteo y reemplazarla por la solución rehidratante que deberá ser la bebida obligatoria durante los 2 primeros días de tratamiento. Al 3° y 4° día de tratamiento puede suministrarse la solución rehidratante en partes iguales con la leche o sustituto lácteo. De ser necesario el tratamiento puede continuarse unos 2 días más (5 y 6° día).

Importante: La suspensión de la leche durante las primeras 48 horas es necesaria para que la mucosa intestinal recupere la capacidad de absorción de nutrientes complejos (proteínas, polisacáridos). No respetar el ayuno lácteo indicado puede llevar al exacerbamiento de la diarrea.

La rehidratación oral está indicada en los casos de deshidratación leve moderada (5 - 8% del peso corporal total). Este estado es fácil de apreciar clínicamente por medio de la prueba del pliegue cutáneo, hundimiento de los ojos, temperatura de las extremidades.

Deshidrataciones más severas, con animal en decúbito, extremidades frías, deberán tratarse mediante rehidratación parenteral hasta que el estado del animal permita el tratamiento con rehidratación oral. En la administración forzada debe evitarse falsa vía.

No mezclar con otros medicamentos (antibióticos, sulfamidas, astringentes) con la solución rehidratante.

Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
Almacenar protegido de la luz directa, calor y a una temperatura entre 15°C a 30°C

**Tiempo de retiro:** 0 días.

**Presentación:** Sobres de 50 g **Uso veterinario.**

Servicios Integrados de Producción Animal S.A.
+51 981 360 341
cta@servipran.com
http://www.servipran.com