



CALCIORAL B₁₂

Propilenglicol con calcio y magnesio en solución oral

Composición por ml:

Propilenglicol	150 g
Calcio propionato	200 g
Calcio formiato	50 g
Magnesio cloruro hexahidrato	8 g
Vitamina B ₃ (Niacina)	13 g
Vitamina B ₁₂ (cianocobalamina)	35 mg
Excipientes c.s.p.	700.00 ml



Indicaciones:

La hipocalcemia es una enfermedad metabólica que se manifiesta por presentar unos niveles de calcio en sangre bajos, que aparece entre 24 horas antes del parto hasta 4 días postparto y se caracteriza por la aparición de debilidad, postración, la vaca no puede levantarse y en caso grave puede llegar al shock y muerte del animal.

La hipocalcemia es una enfermedad metabólica asociada al estrés que provocan los sistemas intensivos de producción. La hipocalcemia subclínica no se detecta fácilmente, puede llegar a afectar al 33% del total del hato y hasta al 50 % de las vacas adultas, mientras que hipocalcemia clínica (fiebre de leche) puede presentarse entre el 3 y el 7%.

Ante la presencia de una vaca con fiebre de leche y tumbada, se debe administrar solución de calcio por vía intravenosa. Sin embargo, para el tratamiento de la hipocalcemia subclínica está indicado el uso de calcio por vía oral, que mantiene niveles más elevados de calcio en sangre 20, 24 y 36 horas después del tratamiento.

El uso de soluciones de calcio endovenoso en vacas aparentemente sanas al parir, está contraindicado, porque provoca un pico elevado de calcio en sangre e inhibe la Paratohormona (PTH), dando lugar a la aparición de hipocalcemia subclínica, con presencia de niveles más bajos de Ca en sangre en comparación con las vacas no tratadas.

Indicaciones:

Vacas: Prevención de hipocalcemia, tratamiento de hipocalcemia o fiebre de la leche antes y después del parto, tratamiento de las recaídas de hipocalcemia, osteomalacia, coadyuvante al tratamiento de la cetosis, mejorador la función ruminal, mejorador la involución uterina, estimulante del apetito, estimulante de la producción de leche.

Dosificación:

Vacas: 1 a 2 frascos de 700 ml/animal, vía oral, inmediatamente después del parto.

En casos especiales como partos distócicos, tratamiento de recaídas de hipocalcemia suministrar un frasco de 700 ml por 2 días consecutivos.

En hipocalcemia clínica aplicar un calcio vía intravenosa (CALCIFOS MG), pero se puede suministrar 1 a 2 frascos 700 ml de CALCIORAL B₁₂ a falta de calcio endovenoso, pero teniendo mucho cuidado de aplicar por falsa vía (pulmón).

Coadyuvante al tratamiento de la cetosis bovina 1 frasco 700 ml, durante 2 a 3 días consecutivos.

Precauciones:

Consulte al Médico Veterinario.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consérvese bien cerrado, en un lugar fresco, seco a temperaturas entre 5 a 30°C.

Tiempo de retiro:

No requiere.

Presentaciones:

Envases 700 ml (01 dosis) y 4.90 litros (07 dosis).