

PREVENCIÓN DE DIARREA Y NEUMONIA EN TERNERAS

La implementación del protocolo implica tomar medidas rutinarias de bioseguridad orientadas a:

1. Bajar la carga infecciosa en el ambiente; corrales, cuna, bebederos, comederos.
2. Aumentar la inmunidad del ternero recién nacido.
3. Tratamiento oportuno de casos clínicos infecciosos.

El objetivo es disminuir al mínimo la morbilidad y mortalidad de neumonías y diarreas en terneras los primeros días de vida.

1. BAJAR LA CARGA INFECCIOSA (VIRAL, BACTERIANA).

DESPADAC: Limpieza y desinfección de cunas, comederos y bebederos con desinfectante bactericida, viricida y fungicida: Diluir 4 ml del producto en 1 litro agua (80 ml/mochila de 20 litros), aplicando 1 mochila para 50 metros cuadrados, con frecuencia de 7 días.

2. MEJORAR LA INMUNIDAD DE LOS RECIÉN NACIDOS: A partir del segundo día de nacido suministrar:

- a. **INMODULEN**, aplicar 5 ml vía intramuscular y repetir la misma dosis 48 horas después. y/o **INMUNAIR 17.5%**, vía oral con la leche 5 ml durante 5 días consecutivos.
- b. **GLUCAN MOS** en dosis oral 10 gr por ternera mezclado con la leche, durante 30 días consecutivos. Acción: Inmuno-estimulante y estabilizante de la flora intestinal, mejora la digestión y previene las diarreas.
- c. **PROMOCALIER L47.0**, vía oral 5 ml por ternera mezclado con la leche, durante 7 días consecutivos. Acción: Mejorador del metabolismo y del estatus inmunitario en los periodos de estrés post infecciones, estimulante del apetito, multivitamínico del complejo B más 20 aminoácidos.

3. REHIDRATAR Y SUMINISTRAR ENERGIZANTES CON REGULADORES DEL PH INTESTINAL. Suministrar

REVIVE, A los primeros síntomas de diarrea suministrar 1 sobre del producto diluido en 2 litros de agua limpia y tibia, por día; si los síntomas son agudos administrar 2 sobres diarios: mañana y tarde, hasta que desaparezcan los síntomas, incluso si es menester se puede quitar el suministro de leche parcia o total.

4. TRATAMIENTO OPORTUNO DE CASOS CLÍNICOS INFECCIOSOS: Suministrar

- a. **SULFAMUNE**, vía oral 5 g por ternera mezclado con la leche, durante 5 a 7 días consecutivos. o
- b. **ROXACIN ORAL**, vía oral 5 ml por ternera mezclado con la leche, durante 5 a 7 días consecutivos.



DESPADAC
60 ml/20 litros



GLUCANMOS
10 g/día/15 días



PROMOCALIER L 47.0
5 ml/ternero/7días



REVIVE
50 g/2 L agua/2días



INMODULEN
5 ml/ternero/5días